



[EN] Consumer information

A full contact flexible wound dressing for the prevention and treatment of radiation dermatitis.

StrataXRT is a semi-occlusive, self-drying and transparent gel.

When used as directed StrataXRT dries to form a protective layer that is gas permeable and waterproof which hydrates and protects compromised skin areas and superficial wounds from chemical and microbial invasion.

StrataXRT may be directly applied to radiation dermatitis, compromised skin surfaces, superficial wounds and first and second degree burns.

How StrataXRT works

StrataXRT dries to form a thin, flexible wound dressing which hydrates and protects affected areas.

StrataXRT has no measurable pH value so does not affect the fragile acid mantle of the skin.

StrataXRT helps to promote a moist wound healing environment for widespread superficial wounds and burns.

StrataXRT is a self-drying, non-sticky, transparent, gel formulation that lightly bonds to the most superficial damaged skin layer.

StrataXRT gel is bacteriostatic and inert.

This moist wound healing environment promotes faster re-epithelialization and significantly reduces the skin's acute inflammatory response seen with both dry and wet desquamation from radiation dosing and first and second degree burns.

In dry desquamation, StrataXRT protects the fragile epidermis and maintains the skin's integrity, preventing the outmost layers from excessive sloughing.

In moist desquamation, StrataXRT protects the dermal stroma from long-term deterioration whilst optimizing the environment for the healing process and reducing the risk of infection.

StrataXRT is ideal for large surface areas and contoured skin like the breasts, face, back and pelvic area, as well as joints and hairy areas without the need for shaving.

Intended use

StrataXRT is used to relieve low grade inflammatory changes such as dry, itching, flaking, peeling and irritated skin.

For more severe inflammatory changes, StrataXRT reduces pain, redness, heat sensation and helps soothe the exposed skin areas.

StrataXRT was developed for use on all types of radiation dermatitis, toxic and compromised skin, superficial wounds and burns, including those resulting from:

- Radiation therapy
- First and second degree burns

StrataXRT may be applied to superficial wounds, burns and areas where skin integrity has been compromised.

StrataXRT may also be used in conjunction with other adjunctive treatments to improve overall results. StrataXRT contains no alcohols, parabens or fragrances and is transparent and odorless. StrataXRT can be used with or without a secondary protective dressing. StrataXRT is suitable for children and people with sensitive skin. StrataXRT is intended for single patient use.

Directions for use

On first use 20 g tubes remove the cap, cut the nozzle tip of the tube and close with the cap after use. On 50 g tubes remove the cap, then the protective seal and close with the cap after use.

Ensure that the affected skin superficial wound is clean and dry.

Gently pat dry as much excess exudate or wound fluid from the area as possible prior to gel application. Apply a very thin layer of StrataXRT directly to the affected area and allow the gel to dry.

StrataXRT should be applied once or twice daily to affected areas or as advised by your physician.

Once dry, StrataXRT may be covered by sunscreen, cosmetics and clothing.

For best results StrataXRT should be maintained in continuous contact with the skin (24 hours a day/ 7 days a week).

When applied correctly to exposed areas, StrataXRT should be dry in 5–6 minutes. If it takes longer to dry you have probably applied too much. Gently remove the excess with a clean tissue or gauze and allow the drying process to continue.

Recommended duration of treatment

StrataXRT is recommended as prophylaxis following the initial radiation dose and should continue to be applied for a minimum of 60–90 days (24 hours a day/7 days a week) post radiation therapy, or until no further improvement is seen.

For chronic radiation dermatitis, continued use is recommended until no further improvement is seen.

How much StrataXRT do I need?

StrataXRT gel is a unique formulation that requires substantially less product per application than typical moisturizing creams or barrier ointments.

- **StrataXRT 20 g (0.75 oz)** is enough to treat an area of 12×15 cm, (5×6 inch) twice per day for over 30 days.
- **StrataXRT 50 g (1.75 oz)** is enough to treat an area of 12×15 cm, (5×6 inch) twice per day for over 75 days.

Caution

- For external use only.
- StrataXRT should not be placed in contact with the eyes.
- StrataXRT should not be applied over topical medications unless advised by your physician.
- StrataXRT may stain clothing if not completely dry. If staining occurs, dry cleaning should be able to remove it without damaging the fabric.
- For correct storage please reclose the tube tightly with the cap.
- Should your radiation dermatitis show signs of infection or failure to heal after 30 days of initial product application, consult your physician.
- If irritation occurs, discontinue use and consult your physician.
- Not suitable for highly exudative wounds, tunnelling wounds or 3rd degree burns.
- Keep out of the reach of children.
- Do not use after the expiration (EXP) date printed on the tube. The expiration (EXP) date does not change once the tube has been opened.
- Do not use if the tube is damaged.

STERILE UNTIL OPENED

Ingredients: Polydimethylsiloxanes, siloxanes, alkylmethyl silicones

[DE] Verbraucherinformation

Eine flexible Wundauflage für die Vorbeugung und Behandlung von Strahlendermatitis.

StrataXRT ist ein semi-okklusives, selbsttrocknendes und transparentes Gel.

Bei ordnungsgemäßer Anwendung bildet StrataXRT nach dem Trocknen eine Schutzschicht, die sowohl gasdurchlässig als auch wasserundurchlässig ist. So werden beeinträchtigte Hautstellen und offene Wunden mit Feuchtigkeit versorgt und vor chemischen und mikrobiologischen Verunreinigungen geschützt.

StrataXRT kann auf Strahlendermatitis, geschwächten Hautflächen, oberflächlichen Wunden und Verbrennungen ersten und zweiten Grades aufgetragen werden.

Wie StrataXRT wirkt

StrataXRT trocknet zu einer dünnen, flexiblen Wundauflage welche die betroffenen Hautstellen hydratiert und schützt.

StrataXRT hat keinen messbaren pH-Wert und beeinträchtigt somit den fragilen Säuremantel der Haut nicht.

StrataXRT begünstigt eine feuchte Wundheilungsumgebung für großflächige oberflächliche Wunden und Verbrennungen.

StrataXRT ist ein selbsttrocknendes, nicht klebendes, transparentes Gel, das sich leicht an die geschädigte Hautoberfläche bindet.

StrataXRT Gel ist bacteriostatisch und inert.

Diese feuchte Wundheilungsumgebung fördert eine schnellere Epithelneubildung und reduziert die akute Entzündungsreaktion von Strahlendosierung verursachter trockener und feuchter Desquamation und Verbrennungen zweiten Grades.

Bei der trockenen Desquamation schützt StrataXRT die empfindliche Epidermis und unterstützt die Unversehrtheit der Haut indem eine exzessive Schuppung der äussersten Hautschicht verhindert wird.

Bei der feuchten Desquamation schützt StrataXRT das Hautgewebe vor Langzeitschäden, während der Reparaturprozess optimiert und das Infektionsrisiko minimiert wird.

StrataXRT eignet sich ideal für grosse und unebene Hautoberflächen wie Brust, Gesicht, Rücken und Beckenbereich, sowie für Gelenke und behaarte Hautstellen, ohne diese vorher rasieren zu müssen.

Anwendungszweck

StrataXRT wird angewendet um leichte Entzündungsreaktionen wie Trockenheit, Juckreiz, Abschuppung, Hautabschälungen und gereizte Haut zu lindern.

Bei stärkeren Entzündungsreaktionen reduziert StrataXRT Schmerz, Rötungen, Hitzeempfindung und beruhigt die exponierten Hautstellen.

StrataXRT wurde für alle Arten von Strahlendermatitis, toxischer und geschwächter Haut, oberflächlichen Wunden und Verbrennungen entwickelt. Diese können durch folgende Ursachen entstanden sein:

- Strahlentherapie
- Verbrennungen ersten und zweiten Grades

StrataXRT kann auf oberflächlichen Wunden, Verbrennungen und Bereichen, bei denen die Hautintegrität beeinträchtigt wurde, aufgetragen werden.

StrataXRT kann auch in Verbindung mit weiteren Behandlungen benutzt werden um das Endresultat zu verbessern. StrataXRT enthält weder Alkohol, noch Duftzusätze oder Parabene und ist transparent und geruchlos. StrataXRT kann mit oder ohne sekundärerem Schutzverband verwendet werden. StrataXRT ist für die Anwendung bei Kindern und Personen mit empfindlicher Haut geeignet. StrataXRT ist für eine Einpatientenbehandlung bestimmt.

Anwendungshinweise

Bei der ersten Benutzung der 20g Tube: Den Verschluss entfernen und die Tubenspitze abschneiden. Nach dem Gebrauch die Tube wieder verschließen. Bei der ersten Benutzung der 50g Tube: Den Verschluss entfernen und die Schutzfolie abziehen. Nach dem Gebrauch die Tube wieder verschließen.

Es muss sichergestellt werden, dass die betroffene Hautstelle sauber und trocken ist.

Vor dem Auftragen des Gels vorsichtig Exsudat oder überschüssige Wundflüssigkeit – so weit wie möglich – aus der Wunde entfernen.

StrataXRT sehr dünn auf die betroffene Hautstelle auftragen und das Gel trocknen lassen.

StrataXRT sollte ein- bis zweimal täglich, oder wie von Ihrem Arzt verordnet, auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen werden.

Nach dem Trocknen können auf den StrataXRT-Gelfilm Sonnencremes oder Kosmetika aufgetragen, sowie Kleidung angezogen werden.

Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn StrataXRT dauerhaft mit der Haut in Kontakt ist (24 h/ Tag, 7 Tage/Woche).

Bei ordnungsgemäßer Anwendung auf den betroffenen Stellen sollte StrataXRT innerhalb von 5–6 Minuten getrocknet sein. Sollte die Trockenzzeit überschritten werden, wurde ggf. zu viel Gel aufgetragen. Den Überschuss vorsichtig mit einem sauberen Tuch oder Gazestück abputzen und das verbleibende Gel weiter trocknen lassen.

Empfohlene Anwendungsdauer

StrataXRT wird zur Prophylaxe nach der ersten Strahlendosis empfohlen. Die Anwendung sollte mindestens über einen Zeitraum von 60–90 Tagen (24 h/Tag, 7 Tage/Woche) nach der Strahlentherapie fortgesetzt werden, oder bis keine weitere Verbesserung mehr sichtbar ist.

Bei einer chronischen Strahlendermatitis sollte die Behandlung so lange fortgesetzt werden, bis keine weitere Verbesserung mehr sichtbar ist.

Empfohlene Packungsgröße

StrataXRT Gel ist eine einzigartige Rezeptur, die erheblich weniger Produkt pro Anwendung benötigt als typische Feuchtigkeitscremes oder Wundsalben.

• **StrataXRT 20 g** ist ausreichend, um eine Fläche von 12×15 cm zweimal täglich für die Dauer von mehr als 30 Tagen zu behandeln.

• **StrataXRT 50 g** ist ausreichend, um eine Fläche von 12×15 cm zweimal täglich für die Dauer von mehr als 75 Tagen zu behandeln.

Warnhinweise

- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- StrataXRT darf nicht mit den Augen in Kontakt gebracht werden.

• StrataXRT sollte nicht ohne vorherige ärztliche Rücksprache auf andere Mittel zur Hautbehandlung aufgetragen werden.

• Wenn StrataXRT noch nicht vollständig getrocknet ist, kann es Flecken auf der Kleidung verursachen. Im Falle einer Verunreinigung entfernen eine chemische Reinigung die Flecken ohne den Stoff zu beschädigen.

• Für eine korrekte Aufbewahrung die Tube fest mit der Verschlusskappe verschließen.

• Sollte Ihre Wunde Infektionszeichen aufweisen oder innerhalb von 30 Tagen nach der Erstbenutzung nicht heilen, konsultieren Sie Ihren Arzt.

• Sollten Hautreizungen auftreten, brechen Sie die Behandlung ab und konsultieren Sie Ihren Arzt.

• Nicht geeignet bei stark exsudierenden und tunnelförmigen Wunden oder Verbrennungen dritten Grades.

• Für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

• Nach dem auf der Tube angegebenen Verfallsdatum (EXP) nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum ändert sich nach dem Öffnen der Tube nicht.

• Nicht verwenden, wenn die Tube beschädigt ist.

STERIL WENN UNGEÖFFNET

Wirkstoffe: Polydimethylsiloxane, Siloxane, Alkylmethylsilikone

[FR] Informations consommateurs

Pansement filmogène souple pour la prévention et le traitement des radiodermites.

StrataXRT est semi-occlusif, à séchage automatique et transparent.

Si les consignes d'utilisation sont scrupuleusement suivies, StrataXRT forme, après séchage, une couche protectrice qui est à la fois imperméable à l'eau et perméable au gaz. Cette pellicule protège et hydrate les parties abîmées de la peau et les plaies superficielles.

Le gel StrataXRT peut être appliqué directement sur les radiodermites, les parties abîmées de la peau, les plaies superficielles mais également sur les brûlures du premier et second degré.

Mode d'action de StrataXRT

En séchant StrataXRT forme un fin pansement souple qui protège et hydrate les zones compromises de la peau.

StrataXRT n'a aucune valeur de pH mesurable; de ce fait, il n'y a aucune interaction avec le fragile manteau acide de la peau.

StrataXRT aide à créer un environnement propice à la cicatrisation des lésions cutanées, ainsi que des plaies et les brûlures superficielles.



La formulation de StrataXRT en un gel transparent, non collant, à séchage automatique, n'adhère pas que légèrement à la couche externe la plus endommagée de la peau.

StrataXRT gel est bactériostatique et inerte.

Cet environnement humide est idéal pour promouvoir une épithérialisation rapide de la peau. De plus il permet de réduire les signes aigus d'inflammations cutanées à la fois dans le cas de désquamation sèche et/ou humide radio induites. La réduction de la charge inflammatoire est également observée pour les brûlures du premier et deuxième degré.

Dans le cas d'une désquamation sèche, StrataXRT protège le fragile épiderme et maintient l'intégrité de la peau en empêchant une désquamation excessive de la couche supérieure de la peau.

Dans le cas d'une désquamation humide, StrataXRT protège le stroma dermique d'une détérioration à long terme, tout en créant un milieu favorisant le processus de réparation et réduisant les risques d'infection.

Le gel StrataXRT est idéal pour le traitement de surfaces étendues ainsi que pour les zones telles que la poitrine, le visage, le dos, le bassin, ainsi que pour les articulations et les parties poilues ; il n'est pas nécessaire de procéder au rasage de ces zones.

Mode d'administration

StrataXRT est utilisé pour soulager les signes inflammatoires cutanés légers comme les sécheresses ou les irritations cutanées, les rashes, les démangeaisons et/ou les pelades.

Pour des signes inflammatoires plus graves, StrataXRT soulage de la douleur, réduit la rougeur et la sensation de chaleur et aide à soulager les surfaces exposées de la peau.

StrataXRT a été spécialement développé pour la prise en charge de tous types de radiodermites, des peaux intoxiquées et/ou abîmées, mais également de plaies et de brûlures superficielles pouvant résulter :

- de la radiothérapie
- des brûlures du premier et du second degré

StrataXRT peut être appliqué directement sur les plaies superficielles, les brûlures ou toutes zones où l'intégrité de la peau a été compromise.

StrataXRT peut également être utilisé avec des traitements complémentaires en vue d'améliorer les résultats globaux. StrataXRT ne contient ni alcool, ni parabène, ni parfum. Il est transparent et sans odeur. StrataXRT peut être utilisé avec ou sans pansement secondaire. StrataXRT convient aux enfants. Chaque tube de StrataXRT est à usage individuel.

Mode d'emploi

À la première utilisation d'un tube de 20g, dévisser le bouchon, couper l'embout du tube. Refermer le tube après chaque utilisation. Lors de la première utilisation d'un tube de 50g, dévisser le bouchon et retirer l'opercule protecteur. Refermer le tube après chaque utilisation.

Avant toutes applications s'assurer que la plaie ou la zone à traiter est propre.

Avant d'appliquer le gel, tamponner délicatement la plaie pour éliminer tout surplus d'exsudat.

Appliquer une fine couche de StrataXRT sur la zone affectée et laisser sécher.

Appliquer StrataXRT une ou deux fois par jour sur les zones exposées ou suivant la prescription du médecin.

Une fois que le gel est sec, StrataXRT peut être recouvert de crème solaire, de produits cosmétiques ou de vêtements compressifs.

Pour de meilleurs résultats, StrataXRT doit être maintenu en contact permanent avec la peau (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7).

Si correctement appliqué, StrataXRT sèche en 5 à 6 minutes. Dans le cas contraire trop de produit a été appliqué: retirer le surplus à l'aide d'un lingé propre ou d'une compresse, et laissez sécher.

Durée de traitement recommandé

L'application de StrataXRT devrait commencer immédiatement après la première séance de radiothérapie. Il est recommandé de poursuivre l'application de StrataXRT pendant un minimum de 60 à 90 jours (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7) après l'arrêt de la radiothérapie. Par la suite, si aucune amélioration n'est constatée, l'arrêt du traitement est envisageable.

En cas de radiodermite chronique, poursuivre l'application jusqu'à ce qu'aucune amélioration ne soit constatée.

Choisir son tube de StrataXRT dans la gamme en fonction de vos besoins

StrataXRT contient une formule unique permettant d'appliquer moins de produit par rapport à une crème hydratante ou une pomade cicatrisante traditionnelle pour une même surface.

• **StrataXRT 20g** suffit pour traiter une surface de 12x15 cm, à raison de deux applications par jour pendant une durée minimum de 60 jours.

• **StrataXRT 50g** suffit pour traiter une surface de 12x15 cm, à raison de deux applications par jour une durée minimum de 75 jours.

Mise en garde

- Usage externe uniquement.
- StrataXRT ne doit pas être mis en contact avec les yeux.
- Ne pas appliquer StrataXRT sur d'autres traitements cutanés, sans un avis médical préalable.
- En cas de séchage incomplet StrataXRT est susceptible de tâcher les vêtements. Dans ce cas un nettoyage à sec permettra de la retirer sans endommager les vêtements.
- Pour une meilleure conservation, bien refermer le tube après utilisation.
- Si votre radiodermite semble s'infecter ou ne pas guérir sous 30 jours de traitement, consulter un médecin.
- En cas de démangeaisons, interrompre le traitement et consulter votre médecin traitant.
- Ne convient pas pour les plaies très exsudatives, bénignes ou les brûlures du 3^{ème} degré.
- A conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser après la date d'expiration (EXP) qui figure sur le tube. Une fois le tube ouvert, la date d'expiration (EXP) n'est pas modifiée.
- Ne pas utiliser si le tube est endommagé.

STÉRILE JUSQU'À L'OUVERTURE

Ingrediént : Polydiméthylsiloxane, Siloxane, Silicones Alkylmethyls

[IT] Informazioni per il consumatore

Una medicazione di contatto flessibile usata per la prevenzione e il trattamento della radiodermite.

StrataXRT è un gel semi-occlusivo, autoasciugante e trasparente.

Se utilizzato come indicato, StrataXRT si asciuga in modo da formare uno strato di protezione che è impermeabile ai gas e impermeabile all'acqua e che idrata e protegge le aree epidermiche compromesse e le ferite superficiali da invasioni chimiche e microbiche.

StrataXRT può essere direttamente applicato su radiodermite, superfici epidermiche compromesse, ferite superficiali e ustioni di primo e secondo grado.

Come funziona StrataXRT

StrataXRT si asciuga in modo da formare uno strato di protezione sottile, flessibile che idrata e protegge le aree danneggiate.

StrataXRT non ha un valore di pH misurabile, di conseguenza non danneggia la fragile superficie acida della pelle.

StrataXRT aiuta a promuovere un ambiente umido per la guarigione di estese ferite superficiali e delle ustioni.

StrataXRT è una formulazione in gel autoasciugante, non appiccicoso e trasparente, che aderisce delicatamente allo strato più superficiale di pelle danneggiata.

StrataXRT gel è batteriostatico ed inerte.

L'ambiente umido per la guarigione della ferita favorisce una ripielistizzazione più veloce e una risposta infiammatoria acuta significativamente ridotta, sia in caso di désquamatione secca che umida da esposizione a radiazioni ed ustioni di primo e secondo grado.

In caso di désquamatione secca, StrataXRT protegge l'epidermide fragile e mantiene l'integrità della pelle, preventendo l'eccessiva desquamazione degli strati superiori.

In caso di désquamatione umida, StrataXRT protegge lo stroma dell'epidermide dal deterioramento a lungo termine e al tempo stesso ottimizza l'ambiente per il processo di guarigione della ferita e riduce il rischio di infezione.

StrataXRT è ideale per aree superficiali estese e per le parti sagomate, come seno, viso, schiena ed area pelvica, così come per articolazioni e aree pilifere senza bisogno di rasatura.

Uso previsto

StrataXRT è usato per alleviare stati infiammatori lievi, come pelle secca, pruriginosa, desquamata, spallata e irritata.

Per stati infiammatori più severi, StrataXRT riduce dolore, rosore, sensazione di calore ed aiuta a lenire le aree esposte della pelle.

StrataXRT è stato sviluppato per l'uso su tutti i tipi di radiodermite, pelle compromessa e danneggiata, ferite superficiali ed ustioni, incluse quelle risultanti da:

- Radioterapia
- Ustioni di primo e secondo grado

StrataXRT può essere applicato su ferite superficiali, ustioni e su aree in cui l'integrità della pelle è stata compromessa.

StrataXRT può essere utilizzato in combinazione con ulteriori trattamenti per migliorare i risultati complessivi. StrataXRT non contiene alcool, paraben o fragranze ed è trasparente ed inodore. StrataXRT può essere utilizzato con o senza un rivestimento protettivo secondario. StrataXRT è adatto a bambini e persone con pelle sensibile. StrataXRT è pensato per l'utilizzo da parte di un solo paziente.

Istruzioni per l'uso

Al primo utilizzo del tubetto da 20g rimuovere il tappo, tagliare la punta del tubetto e richiudere con il tappo dopo l'uso. Nel tubetto da 50g rimuovere il tappo, poi il sigillo di protezione e richiudere con il tappo dopo l'uso.

Assicurarsi che l'area epidermica interessata o la ferita superficiale sia pulita.

Tamponare delicatamente il più possibile di essudato in eccesso o di fluido della ferita dalla zona interessata prima di applicare il gel.

Applicare uno strato molto sottile di StrataXRT direttamente sull'area danneggiata e permettere al gel di asciugare.

StrataXRT deve essere applicato una o due volte al giorno sulle aree interessate o come indicato dal medico.

Una volta asciutto, StrataXRT può essere coperto da creme solari, cosmetici o indumenti.

Per migliori risultati StrataXRT dovrebbe essere mantenuto in continuo contatto con la pelle (24 ore al giorno/7 giorni alla settimana).

Se applicato correttamente, StrataXRT dovrebbe asciugare in 5-6 minuti. Se impiega più tempo ad asciugare, ne è stata probabilmente applicata una quantità eccessiva. Rimuovere delicatamente la quantità in eccesso con un fazzoletto pulito o una garza e lasciar continuare il processo di asciugatura.

Durata raccomandata del trattamento

StrataXRT è raccomandato come profilassi a seguito della dose di radiazione iniziale e la cui applicazione dovrebbe essere continuata per un minimo di 60-90 giorni (24 ore al giorno/7 giorni alla settimana) post-radiotherapy, o fino a che non si riscontra alcun ulteriore miglioramento.

Per radiodermite cronica, l'uso continuato è raccomandato fino a che non si riscontra alcun ulteriore miglioramento.

Quanto StrataXRT va applicato?

StrataXRT gel è una formulazione unica che richiede sostanzialmente una minor quantità di prodotto per applicazione rispetto alle creme idratanti o agli unguenti di barriera.

• **StrataXRT 20g** è sufficiente per trattare un'area di 12x15 cm due volte al giorno per oltre 30 giorni.

• **StrataXRT 50g** è sufficiente per trattare un'area di 12x15 cm due volte al giorno per oltre 75 giorni.

Avvertenze

- Solo per uso esterno.
- Evitare il contatto di StrataXRT con gli occhi.
- StrataXRT non dovrebbe essere applicato su altri trattamenti topici senza il parere del medico.
- StrataXRT può macchiare gli abiti se non completamente asciutto. In caso di macchia, il lavaggio a secco dovrebbe essere in grado di rimuoverla senza danneggiare il tessuto.
- Per una corretta conservazione richiedere bene il tubetto con il tappo.
- Nel caso in cui la radiodermite mostrasse segni di infezione o non riuscisse a guarire dopo 30 giorni dall'inizio dell'applicazione del prodotto, consultare il medico.
- In caso di irritazione, interrompere l'uso e consultare il medico.
- Non adatto a ferite altamente essudative o sottocutanee o ad ustioni di terzo grado.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non usare dopo la data di scadenza (EXP) indicata sulla confezione. La data di scadenza (EXP) non cambia una volta che il tubetto è stato aperto.
- Non usare se il tubetto è danneggiato.

STERILE FINO ALL'APERTURA

Ingredienti: Polidimetilsilossani, Silossani, Alchilmetyl Siliconi

	Consult instructions for use Gebrauchsweisungen beachten Respecter le mode d'emploi Consultare le istruzioni per l'uso
	Use by date Verfallsdatum Date limite d'utilisation Data di scadenza
	Batch code Seriennummer Número de lote Codice del lotto
	Sterilized using irradiation Durch Bestrahlung sterilisiert Stérile par irradiation Sterilizzato mediante irradiazione
	Do not use if the tube is damaged Nicht verwenden, wenn die Tube beschädigt ist Ne pas utiliser si le tube est endommagé Non utilizzare se il tubetto è danneggiato

Stratpharma AG
Aeschenvorstadt 57
CH-4051 Basel
Switzerland / Schweiz / Suisse / Svizzera

Date of preparation of this information
Ausstellungsdatum dieser Information
Date de dernière mise à jour des informations
Data di revisione del testo

02/2017

Stratpharma

Switzerland

www.strataxrt.com



CE 0086

SX000INT1P106-1116